

《助产学》期末考试题 -2022 秋冬

[单选题][2分][难度 2]

- 1、外阴局部受伤易形成水肿的部位是 (C)
- A.阴阜
 - B.小阴唇
 - C.大阴唇
 - D.阴蒂
 - E.阴道前庭

[单选题][2分][难度 2]

- 2、受卵巢激素影响而发生周期性脱落的子宫组织结构是 (E)
- A.黏膜层
 - B.肌层
 - C.浆膜层
 - D.基底层
 - E.功能层

[单选题][2分][难度 2]

- 3、有关正常成人子宫,错误的是 (A)
- A.子宫位于骨盆中央,坐骨棘水平以下
 - B.子宫长为 7~8cm
 - C.子宫重约 50g
 - D.子宫腔容积约 5ml
 - E.子宫腔呈上宽下窄的三角形

[单选题][2分][难度 2]

- 4、某女婴出生时,艾氏评分 9 分,身体健康,出生 5 天查体时发现阴道有白带及少量血性分泌物似月经样,这种现象是 (B)
- A.出生时阴道损伤
 - B.假月经
 - C.月经
 - D.阴道感染
 - E.阴道细菌感染

[单选题][2分][难度 2]

- 5、关于胎盘功能,错误的为 (D)
- A.供给营养物质及排泄作用
 - B.能替代胎儿呼吸功能
 - C.IgG 可通过胎盘使胎儿获得抗体能防御细菌、病毒及药物通过
 - E.能合成激素和酶

[单选题][2分][难度 2]

- 6、不属于孕激素生理作用的是 (E)
- A.使子宫肌肉松弛
 - B.抑制输卵管蠕动
 - C.使乳腺腺泡增生
 - D.对下丘脑和腺垂体有负反馈作用
 - E.使排卵后体温下降 0.3~0.5℃

[单选题][2分][难度 2]

- 7、黄体发育达高峰在排卵后 (A)
- A.7~8 天
 - B.9~10 天
 - C.11~12 天
 - D.13~14 天
 - E.15~16 天

[单选题][2分][难度 2]

- 8、妊娠期血容量增加达高峰是在 (D)
- A.24~26 周
 - B.27~28 周
 - C.29~30 周
 - D.32~34 周
 - E.36~40 周

[单选题][2分][难度 2]

- 9、肩先露时,胎心音听得最清楚的部位是 (B)
- A.脐部上方
 - B.脐部下方
 - C.脐部左侧
 - D.脐部右侧
 - E.左下腹部

[单选题][2分][难度 2]

- 10、孕妇,妊娠 27 周,在产前检查中发现其血红蛋白偏低,需要补充铁剂,正确的服药时间是 (B)
- A.餐前半小时
 - B.餐后 20 分钟
 - C.空腹时
 - D.睡前
 - E.晨起后

[单选题][2分][难度 2]

9、患者，女性，24岁。停经45天，为了确诊其是否妊娠，最简单快速且最准确的检查方法是（D）

- A.妊娠试验
- B.黄体酮试验
- C.基础体温测定
- D.超声检查
- E.宫颈黏液检查

[单选题][2分][难度 2]

12、衔接是指胎头（C）

- A.进入中骨盆
- B.顶骨进入骨盆入口平面
- C.双顶径进入骨盆入口平面
- D.顶骨已出骨盆出口平面
- E.双顶径达中骨盆平面

[单选题][2分][难度 2]

13、进入第二产程的主要标志是（E）

- A.破膜
- B.产妇用腹压
- C.拨露
- D.阴道口见先露
- E.宫口开全

[单选题][2分][难度 2]

14、产妇进入第二产程后每次听胎心间隔时间约在（A）

- A.5分钟
- B.10分钟
- C.20分钟
- D.30分钟
- E.40分钟

[单选题][2分][难度 2]

15、关于潜伏期的描述，正确的是（A）

- A.从规律性宫缩开始到宫口扩张3cm
- B.从规律性宫缩开始到宫口扩张7cm
- C.从规律性宫缩开始到宫口扩张5cm
- D.从宫口扩张3cm到宫口开全10cm
- E.从宫口扩张3cm至宫口扩张7cm

[单选题][2分][难度 2]

16、某产妇，26岁。第一胎足月临产14小时，肛查：宫口开全，胎膜已破，胎方位正常，先露头，双顶径达（A）

- A.陪伴在产妇身旁，指导使用腹压
- B.观察胎头是否已达到阴道口
- C.准备产包
- D.消毒外阴
- E.洗手准备接生

[单选题][2分][难度 2]

17、一旦胎膜破裂，应立即观察（D）

- A.心率
- B.呼吸
- C.血压
- D.胎心
- E.脉搏

[单选题][2分][难度 2]

18、关于产程中血压的监测，下列哪项是正确的（B）

- A.每隔1~2小时测量1次
- B.每隔4~6小时测量1次
- C.每隔8~10小时测量1次
- D.在宫缩时血压升高为异常
- E.血压升高者应减少测量次数

[单选题][2分][难度 2]

19、了解胎先露的下降程度，可通过下列哪项检查（C）

- A.腹部四步触诊
- B.腹部听诊
- C.肛门检查或阴道检查
- D.B超检查
- E.双合诊

[单选题][2分][难度 2]

20、某初产妇，宫缩16小时，于8分钟前顺利娩出一重3000g的女婴，胎盘尚未娩出，阴道无流血，处理不正确的是（C）

- A.给产妇肌内注射缩宫素10U
- B.观察外露的脐带是否自行下降延长
- C.牵拉脐带按揉子宫促进胎盘剥离
- D.观察阴道流血
- E.等待，有胎盘剥离征象立即助娩胎盘

[单选题][2分][难度 2]

21、构成软产道的组织，不包括（A）

- A.肛门
- B.阴道
- C.骨盆底软组织
- D.子宫下段

E.子宫颈

[单选题][2分][难度 2]

22、临产的重要标志之一是 (C)

- A.下坠感
- B.剧烈腰酸
- C.节律性宫缩
- D.腹压增加
- E.胎动增加

[单选题][2分][难度 2]

23、不属于影响分娩的因素 (B)

- A.精神心理
- B.伦理道德
- C.产力
- D.胎儿
- E.产道

[单选题][2分][难度 2]

24、关于子宫下段形成的机制,不正确的描述是 (E)

- A.孕 12 周时子宫峡部拉长成为部分的宫腔
- B.由非孕时的子宫峡部伸展成为子宫下段
- C.孕晚期被拉长的子宫峡部最终成子宫下段
- D.临产后的宫缩使子宫下段伸展达 7~10cm
- E.宫缩的缩复作用使子宫峡部逐渐被拉长

[单选题][2分][难度 2]

25、胎先露压迫宫颈的直接作用是 (B)

- A.使宫颈消失
- B.使宫颈扩张
- C.使宫缩节律性加强
- D.使宫颈变软
- E.使宫颈破损

[单选题][2分][难度 2]

26、胎头颅骨的构成,不正确的陈述是 (A)

- A.胎头前凶呈三角形
- B.其中有两块顶骨
- C.两块额骨是组成部分
- D.也包括两块颞骨
- E.还有一块枕骨

[单选题][2分][难度 2]

27、关于胎头径线的描述,正确的是 (E)

A.胎头以枕下前凶衔接

B.枕额径以仰伸姿势通过产道

C.足月儿枕额径平均值约 9.5cm

D.双顶径是胎头最大的前后径

E.足月儿的枕额径平均约为 9.3cm

[单选题][2分][难度 2]

28、就胎体而言,确定胎方位的重要标记是 (C)

- A.胎儿双肩连线
- B.最低位的颅骨缝
- C.矢状缝和凶门
- D.胎儿的脊柱
- E.胎头双顶径

[单选题][2分][难度 2]

29、分娩时产妇不良的精神心理因素可导致 (B)

- A.产妇精神分裂
- B.胎儿窘迫
- C.胎儿畸形
- D.急产
- E.会阴重度撕裂

[单选题][2分][难度 2]

30、关于分娩机制的陈述,不正确的是 (D)

- A.胎头下降是产程进展的重要标志
- B.胎头俯屈以适应最小的产道径线
- C.外旋转使胎头与胎肩呈垂直位置
- D.第二产程末胎头完成内旋转动作
- E.分娩机制七个动作是连续进行的

[单选题][2分][难度 2]

31、29.产褥期妇女心理调适过程中,易出现压抑情绪,通常发生在 (B)

- A.依赖期
- B.依赖-独立期
- C.独立期
- D.抑郁期
- E.开朗期

[单选题][2分][难度 2]

32、未母乳喂养或未做到及时有效的母乳喂养的产妇,通常可于产后 3-4 天内乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热,称为 (C)

A.产褥热

- B.产后热
- C.泌乳热
- D.乳腺炎
- E.产褥感染

[单选题][2分][难度 2]

33、产后血性恶露一般持续 (B)

- A.1-2天
- B.3-4天
- C.5-6天
- D.7-8天
- E.9-10天

[单选题][2分][难度 2]

34、产妇产后 4-6 小时应排尿的原因是 (D)

- A.利于伤口恢复
- B.利于产妇舒适
- C.利于产妇活动
- D.利于子宫收缩
- E.利于乳汁分泌

[单选题][2分][难度 2]

35、每次哺乳前,产妇清洁乳房应 (A)

- A.用湿毛巾擦净乳房
- B.用肥皂水清洗乳房
- C.用酒精消毒乳房
- D.用专用消毒剂消毒乳房
- E.用碘伏消毒乳房

[单选题][2分][难度 2]

36、可以进行产后锻炼的时间是 (B)

- A.产后第 1 天
- B.产后第 2 天
- C.产后第 3 天
- D.产后第 4 天
- E.产后第 5 天

[单选题][2分][难度 2]

37、某女婴出生时, Apgar 氏评分 9 分, 身体健康, 出生 5 天查体时发现阴道有白带及少量血性分泌物似月经样, 这种现象是 (B)

- A.出生时阴道损伤
- B.假月经
- C.月经

- D.阴道感染
- E.阴道细菌感染

[单选题][2分][难度 2]

38、某产妇, 分娩后 7 日, 浆液性恶露, 量少, 发现侧切伤口局部有硬结, 对于该伤口, 正确的护理措施是 (C)

- A.每日观察恶露的性状
- B.每日观察宫缩情况
- C.分娩后 7~10 天给予温水坐浴
- D.勤换会阴垫
- E.硫酸镁湿热敷

[单选题][2分][难度 2]

39、患者女性, 26 岁。妊娠 39 周, 做产后乳房护理不正确的指导是 (D)

- A.按摩乳房
- B.喂奶结束后, 挤出乳汁涂抹于乳头上
- C.用湿毛巾擦洗乳头
- D.用酒精擦洗乳头
- E.热敷

[单选题][2分][难度 2]

40、预防产后乳房胀痛, 不正确的措施是 (C)

- A.分娩后马上吸吮
- B.确保正确的含接姿势
- C.坚持按时喂哺
- D.做到充分有效的吸吮
- E.按需哺乳

[单选题][2分][难度 2]

41、初产妇, 27 岁, 阴道助娩一男婴, 会阴 I 度裂伤, 产后 6 小时未排尿, 检查阴道出血不多, 宫底脐上 1 横指, 该产妇可能的问题是 (C)

- A.子宫复旧不良
- B.宫腔积血
- C.尿潴留
- D.腹胀
- E.阴道伤口疼痛

[单选题][2分][难度 2]

42、早期流产是指 (C)

- A.妊娠于 8 周前终止
- B.妊娠于 8~12 周终止
- C.妊娠于 12 周前终止

D.妊娠于 12~28 周终止

E.妊娠于 20 周前终止

[单选题][2 分][难度 2]

43、复发性流产是指自然流产连续发生 (C)

A.2 次

B.2 次以上

C.3 次或 3 次以上

D.4 次以上

E.5 次以上

[单选题][2 分][难度 2]

44、输卵管妊娠最常见的病因是 (A)

A.输卵管炎症

B.输卵管发育异常

C.子宫发育不良

D.输卵管手术史

E.孕卵外游

[单选题][2 分][难度 2]

45、输卵管妊娠破裂的护理评估, 错误的是 (D)

A.下腹剧痛

B.阴道不规则出血

C.停经史

D.抽搐与昏迷

E.失血性休克

[单选题][2 分][难度 2]

46、输卵管妊娠破裂并发失血性休克的处理最恰当的是 (D)

A.立即诊断性刮宫

B.立即剖腹探查

C.纠正休克

D.抗休克措施与手术同时进行

E.腹腔镜检查

[单选题][2 分][难度 2]

47、输卵管妊娠破裂并发失血性休克的护理措施, 错误的是 (A)

A.取半卧位, 吸氧

B.尽快建立静脉通道

C.做好腹部急诊手术的准备

D.协助做好各项检查

E.密切观察病情变化, 有异常立即报告医生

[单选题][2 分][难度 2]

48、诊断异位妊娠的主要体征之一是 (D)

A.严重的贫血

B.腹部反跳痛

C.触及坚硬包块

D.宫颈抬举痛明显

E.不能平卧位

[单选题][2 分][难度 2]

49、诊断异位妊娠破裂时, 简单、可靠的辅助检查项目是 (C)

A.测定血、尿 HCGB

B.B 超检查

C.阴道后穹窿穿刺

D.腹腔镜检查

E.排出物病理检查

[单选题][2 分][难度 2]

50、当异位妊娠破裂, 内出血未得到控制前, 首优护理诊断是 (E)

A.活动无耐力,与血容量不足有关

B.知识缺乏,与不懂得异位妊娠预后有关

C.自我形象紊乱,与失去生育能力有关

D.尿潴留,与不习惯卧床解尿有关

E.心排出量减少 与腹腔内大出血有关

[单选题][2 分][难度 2]

51、下列与异位妊娠无关的临床表现是 (C)

A.停经

B.阴道流血

C.下肢水肿

D.晕厥与休克

E.腹痛

[单选题][2 分][难度 2]

52、异位妊娠最常见的着床部位是 (B)

A.卵巢

B.输卵管

C.子宫颈

D.子宫角

E.腹腔

[单选题][2 分][难度 2]

53、已婚女性，27岁。停经50天，阴道少量流血1天。晨5时无原因出现下腹剧痛，伴恶心呕吐及一过性晕厥。查面色苍白，血压70/40mmHg，脉搏120次/分，妇科检查：宫颈举痛明显，后穹隆触痛(+)，盆腔触诊不满意。此时最适宜的处理方法是(C)

- A.住院观察病情
- B.给予止痛药物
- C.行阴道后穹隆穿刺，并做急诊手术准备
- D.指导进食以增加热量摄入
- E.行腹腔镜检查

[单选题][2分][难度 2]

54、前置胎盘大出血患者的护理措施，错误的是(E)

- A.迅速建立静脉通道，输液、输血
- B.准确估计出血量
- C.严密观察生命体征、胎心、胎动变化
- D.做好急诊手术的准备
- E.剖宫产前均应作阴道检查明确诊断

[单选题][2分][难度 2]

55、属于前置胎盘的病因是(E)

- A.机械因素
- B.子宫静脉压突然升高
- C.血管病变
- D.吸烟吸毒
- E.子宫内膜病变与损伤

[单选题][2分][难度 2]

56、前置胎盘的主要症状是(D)

- A.突发腹部持续性疼痛伴阴道出血
- B.头痛、眼冒金星、恶心
- C.协调性子宫收缩过强
- D.无痛性反复阴道流血
- E.出现病理性缩复环并有压痛

[单选题][2分][难度 2]

57、疑诊胎盘早剥，能确诊的辅助检查项目是(D)

- A.腹部叩诊
- B.测量血压
- C.腹腔镜
- D.B型超声波
- E.盆腔检查

[单选题][2分][难度 2]

58、确诊胎盘早剥，考虑经阴道分娩，不符合适应症的是(B)

- A.轻型胎盘早剥
- B.臀先露
- C.宫口已扩张
- D.短时能分娩
- E.胎心音好

[单选题][2分][难度 2]

59、胎盘早剥需观察阴道出血的凝血状况，其目的是(C)

- A.判断胎盘剥离的程度
- B.考虑循环血量的变化
- C.及早发现凝血障碍
- D.判断产程的进展
- E.推断贫血的程度

[单选题][2分][难度 2]

60、胎盘早剥孕妇，其“潜在并发症”护理问题，无关的是(E)

- A.子宫胎盘卒中
- B.弥漫性血管内凝血
- C.失血性休克
- D.肾脏衰竭
- E.体液过多

[单选题][2分][难度 2]

61、预防子痫发作的护理措施，错误的是(B)

- A.嘱患者绝对卧床休息
- B.保持病房光线充足
- C.保持环境安静
- D.各项治疗操作尽量集中进行
- E.监测生命体征及神志变化

[单选题][2分][难度 2]

62、子痫患者抽搐时首要的护理措施是(E)

- A.床边加床档，防止受伤
- B.置患者于安静、暗光的单人病房
- C.持续给氧
- D.严密观察病情并记录
- E.用舌钳固定舌头，防止舌咬伤及舌后坠，保持呼吸道通畅

[单选题][2分][难度 2]

63、羊水过多指妊娠期间羊水量超过(B)

- A.1500ml
- B.2000ml
- C.2500ml
- D.3000ml
- E.4000ml

[单选题][2分][难度 2]

64、为多胎妊娠的孕妇提供护理和健康教育,不包括(A)

- A.配合放羊水以减轻压迫症状
- B.整个孕期母亲体重增加 16~18kg
- C.孕晚期时指导孕妇防止跌倒
- D.帮助孕妇和家属完成两次角色转变
- E.第一胎娩出助手固定第二胎的胎位

[单选题][2分][难度 2]

65、关于巨大儿的相关知识,正确的陈述是(D)

- A.胎儿体重达到 4500 克为巨大儿
- B.贫血妇女是巨大儿的高危因素
- C.不宜药物引流,以产钳助产为宜
- D.宫高超常,胎心音听诊区偏高,应考虑巨大儿
- E.第二产程时胎头下降停滞不宜剖宫产

[单选题][2分][难度 2]

66、方女士,27岁,妊娠34周,诊断“轻度子痫前期”住院治疗。自诉因担心药物影响胎儿发育而不愿接受治疗,但又担心不用药病情加重威胁胎儿安全,首先采取的护理措施是(D)

- A.测血压 2~4 次/日
- B.嘱安静休息
- C.注意观察症状
- D.心理护理,解除顾虑
- E.建议转院治疗

[单选题][2分][难度 2]

67、心脏病产妇产褥期的护理,错误的是(C)

- A.产后 24 小时内绝对卧床休息
- B.密切监护生命体征,正确识别心衰征象
- C.心功能 II 级者不宜哺乳,应及时退乳
- D.做好计划生育指导
- E.做好会阴护理,注意子宫复旧,恶露情况

[单选题][2分][难度 2]

68、.不宜妊娠的心脏病妇女是(D)

- A.心功能 I、II 级

- B.高血压史 5 年以上
- C.消化道功能紊乱
- D.严重的心律失常
- E.下肢残障行动不便

[单选题][2分][难度 2]

69、不属于妊娠合并早期心衰体征的是(E)

- A.轻微活动后胸闷、气急、心悸
- B.休息时心率 120 次/分
- C.休息时呼吸超过 20/分
- D.阵发性夜间呼吸困难
- E.血压下降至休克状态

[单选题][2分][难度 2]

70、关于妊娠合并急性病毒性肝炎,下列叙述错误的是(B)

- A.急性肝炎妇女不宜妊娠
- B.孕早期不宜终止妊娠,以免加重肝损害
- C.孕晚期积极预防妊娠期高血压疾病
- D.尽量争取阴道分娩
- E.分娩前做好预防产后出血的准备

[单选题][2分][难度 2]

71、乙型病毒性肝炎的母婴传播途径,错误的是(B)

- A.经胎盘垂直传播
- B.粪-口途径传播
- C.产时胎儿接触母血、羊水等传播
- D.密切生活接触
- E.母乳喂养

[单选题][2分][难度 2]

72、妊娠期贫血的诊断标准,正确的是(A)

- A.血红蛋白 < 100g/L, 红细胞 < 3.5×10¹²/L, 红细胞比容 < 0.30
- B. 血红蛋白 < 110g/L, 红细胞 < 3.5×10¹²/L, 红细胞比容 < 0.25
- C. 血红蛋白 < 125g/L, 红细胞 < 3.5×10¹²/L, 红细胞比容 < 0.35
- D. 血红蛋白 < 120g/L, 红细胞 < 3.5×10¹²/L, 红细胞比容 < 0.30
- E. 血红蛋白 < 130g/L, 红细胞 < 3.5×10¹²/L, 红细胞比容 < 0.30

[单选题][2分][难度 2]

73. 孕妇王某, 34 岁, 初次怀孕, 孕 16 周出现心慌、气短, 心功能 II 级。经过增加产前检查次数, 严密监测孕期经过等, 目前孕 37 周, 自然临产, 该产妇在分娩期应注意的问题中, 描述错误的是 (B)

- A. 常规吸氧
- B. 胎盘娩出后, 腹部放置 20kg 砂袋
- C. 注意保暖
- D. 注意补充营养
- E. 必要时行剖宫产或阴道助产缩短产程

[单选题][2 分][难度 2]

74. 静滴催产素时, 正确的是 (A)

- A. 专人守护, 严密观察宫缩及胎心音
- B. 用药后宫缩愈强, 效果愈好
- C. 可用于不协调性宫缩乏力
- D. 催产素的滴速不应超过 50 滴/分钟
- E. 如出现胎儿窘迫, 只要调慢催产素的滴速即可

[单选题][2 分][难度 2]

75. 不协调性宫缩乏力的正确处理原则是 (D)

- A. 观察生命征
- B. 立即行剖宫产术
- C. 吸氧、静脉补液
- D. 使用强镇静剂、休息、恢复子宫收缩的节律性
- E. 不需特殊处理, 等待自然恢复

[单选题][2 分][难度 2]

76. 关于宫缩过强, 错误的是 (E)

- A. 可发生急产
- B. 易发生软产道损伤
- C. 产妇腹痛持续长
- D. 可出现子宫痉挛性狭窄环
- E. 对胎儿无影响

[单选题][2 分][难度 2]

77. 产妇, 27 岁, 因子宫收缩过强, 出现急产, 对于其新生儿正确的护理措施是 (C)

- A. 早吸吮
- B. 出生后半小时内喂葡萄糖水
- C. 按医嘱给维生素 K1, 肌注
- D. 与母亲皮肤接触
- E. 新生儿抚触

[单选题][2 分][难度 2]

78. 某孕妇, G1P0, 24 岁。妊娠 38 周临产, 2 小时前肛查宫口开 3cm, 现肛查宫口仍开 3cm, 检查: 宫缩 7~8 分钟一次, 持续时间 30 秒, 胎膜未破。正确的处理措施是 (B)

- A. 静脉滴注催产素
- B. 人工破膜
- C. 会阴侧切
- D. 给予镇静剂
- E. 产钳助产

[单选题][2 分][难度 2]

79. 分娩期产妇一旦发现子宫先兆破裂, 首选的措施是 (D)

- A. 行阴道助产, 尽快结束分娩
- B. 以上全正确
- C. 抗休克, 静脉输液、输血
- D. 停止一切操作, 抑制宫缩
- E. 大量抗生素预防感染

[单选题][2 分][难度 2]

80. 某孕妇产前检查胎儿臀位, 为矫正胎位, 护士应指导其选用的体位是 (D)

- A. 头低脚高位
- B. 截石位
- C. 侧卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 俯卧位

[单选题][2 分][难度 2]

81. 某产妇, 28 岁。诊断为臀先露, 下列没有可能是臀位临床表现的是 (B)

- A. 官底可触及胎头
- B. 胎心在脐下左侧最清楚
- C. 脐带脱垂
- D. 产程延长

[单选题][2 分][难度 2]

82. 妊娠 39 周经产妇在田间做农活时急产, 你认为哪项发生的可能性最小 (E)

- A. 会阴、阴道裂伤
- B. 新生儿窒息
- C. 宫颈裂伤
- D. 新生儿颅内出血
- E. 宫缩乏力

[单选题][2分][难度 2]

83、李女士，36岁，初产妇，孕38周，规律宫缩18小时，胎心106次/分钟，宫口开大3cm，先露头S+1，大囟门位于右前方，下列诊断错误的是（E）

- A.胎儿窘迫
- B.潜伏期延长
- C.高龄初产妇
- D.枕后位
- E.滞产

[单选题][2分][难度 2]

84、陈女士，29岁，初产妇，妊娠41周，腹痛5小时入院。骨盆外测量：髂棘间径23cm，髂嵴间径26cm，骶耻外径17.5cm，出口横径9cm，产科检查，头先露，胎心好，估计胎儿体重3000g左右，跨耻征（±）。产妇的骨盆类型最可能为（A）

- A.漏斗骨盆
- B.正常骨盆
- C.均小骨盆
- D.畸形骨盆
- E.扁平骨盆

[单选题][2分][难度 2]

85、不属于胎膜早破病因的是（C）

- A.宫颈内口松弛
- B.胎膜发育不良
- C.胎盘、脐带异常
- D.胎膜受力不均
- E.妊娠后期性交

[单选题][2分][难度 2]

86、胎膜早破的临床表现，不正确的陈述是（C）

- A.咳嗽时有较多液体自阴道流出
- B.上推胎先露可见较多液体流出
- C.石蕊试纸显示流出液pH≥3.5
- D.阴道液干燥片显示见羊齿状结晶
- E.胎膜早破孕妇常担心破水后难产

[单选题][2分][难度 2]

87、分娩期产妇一旦发现子宫先兆破裂，首选的护理措施是（B）

- A.抗休克，静脉输液、输血
- B.停止一切操作，抑制宫缩

C.行阴道助产，尽快结束分娩

- D.大量抗生素预防感染
- E.安置产妇头高脚低

[单选题][2分][难度 2]

88、病理性缩复环常见于（B）

- A.羊水过多
- B.梗阻性难产
- C.双胞胎
- D.巨大儿
- E.胎盘早剥

[单选题][2分][难度 2]

89、产后出血是指顺产胎儿娩出后24小时内出血量超过（E）

- A.100ml
- B.200ml
- C.300ml
- D.400ml
- E.500ml

[单选题][2分][难度 2]

90、产后出血有诸多因素，最主要的原因是（D）

- A.软产道损伤
- B.凝血机制障碍
- C.精神心理
- D.子宫收缩乏力
- E.胎盘因素

[单选题][2分][难度 2]

91、胎儿娩出后立即发生阴道流血，血液鲜红能自凝，子宫收缩良好，检查宫颈重度裂伤，此时考虑出现原因是（C）

- A.重度营养不良
- B.凝血机制障碍
- C.软产道损伤
- D.子宫收缩乏力
- E.胎盘因素

[单选题][2分][难度 2]

92、羊水栓塞产妇首先出现的护理问题是（B）

- A.潜在并发症：休克、急性肾衰
- B.气体交换受损 与肺动脉高压致肺血管阻力增加、肺不张有关

- C.恐惧 与病情危重而产生濒死感有关
D.组织灌注量改变 与失血、DIC 有关
E.有胎儿受损的危险 与产妇循环受阻致胎儿宫内窘迫有关

[单选题][2分][难度 2]

93、预防羊水栓塞的各项措施，不正确的陈述是 (B)

- A.正确使用缩宫素引产方法
B.中期引产先钳出胎块再流出羊水
C.羊膜穿刺次数不超过 3 次
D.积极处理前置胎盘的产妇
E.宫缩间歇时行人工破膜术

[单选题][2分][难度 2]

94、李女士，孕 40 周 G1P0,LOA,临产 16 小时，宫口开大 8cm，先露头 S-2,3 小时无进展，缩宫素静滴后产程依然无进展，由基层转诊入院，初步诊断为“子宫破裂”最可靠的诊断依据是 (D)

- A.产妇疼痛难忍、烦躁、呼叫
B.脐下病理缩复环随宫缩上升
C.阴道多量鲜血流出
D.子宫轮廓不清，腹壁下清楚触及胎体
E.胎心、胎动消失

[单选题][2分][难度 2]

95、产褥感染的病因，错误的是 (D)

- A.产道本身存在细菌
B.妊娠晚期性生活、盆浴
C.医务人员的手、呼吸道以及各种手术器械的接触
D.缩宫素的使用
E.胎膜早破

[单选题][2分][难度 2]

96、产褥感染中最常见的是 (D)

- A.急性输卵管炎
B.急性外阴炎
C.急性盆腔结缔组织炎
D.急性子宫内膜炎
E.急性盆腔腹膜炎

[单选题][2分][难度 2]

97、患者女性，从分娩后第 2 天起，持续 3 天体温在 37.8℃ 左右，子宫收缩好，无压痛，会阴伤口红肿、疼痛，恶露淡红色，无臭味，双乳软，无硬结。发热的原因最可能是

(C)

- A.乳腺炎
B.产褥感染
C.会阴伤口感染
D.上呼吸道感染
E.乳头皲裂

[单选题][2分][难度 2]

98、急性乳腺炎最常见的病因是 (B)

- A.乳管堵塞
B.乳汁淤积
C.乳头破损
D.乳腺手术
E.乳头内陷

[单选题][2分][难度 2]

99、有关产褥感染的处理原则，不正确的是 (D)

- A.有会阴侧切伤口时应健侧卧位
B.半卧位
C.选用有效的抗生素
D.禁用缩宫素，避免感染扩散
E.胎盘残留者，应控制感染后清宫

[单选题][2分][难度 2]

100、给胎儿窘迫的孕妇治疗和护理，正确的是 (E)

- A.立即安置右侧卧位
B.增加缩宫素滴速
C.持续大剂量吸氧
D.胎儿窘迫一定会发展为新生儿窒息
E.向家属讲明病因和处理意见

[单选题][2分][难度 2]

101、孕妇自觉胎动异常，B 超显示胎儿脐带受压，胎儿缺氧早期表现为 (C)

- A.胎心率 ≥ 200 次 / 分，胎动增加
B.胎心率 ≥ 180 次 / 分，胎动增加
C.胎心率 ≥ 160 次 / 分，胎动增加
D.胎心率 ≤ 120 次 / 分，胎动减少
E.胎心率 ≤ 100 次 / 分，胎动减少

[单选题][2分][难度 2]

102、患者女性，足月临产，LOA，宫口开 3cm，胎膜未破，3 小时后感肛门坠胀，流出棕黄色羊水，查：宫口开全 O+4，其处不正确的是 (E)

- A.立即吸氧
- B.左侧卧位,即听胎心
- C.静注5%碳酸氢钠
- D.胎头吸引术助产
- E.剖宫产

[单选题][2分][难度 2]

103、孕妇自觉胎动异常,来医院就诊,护士为其做电子胎心监护,显示胎儿宫内缺氧的是(C)

- A.早期减速
- B.变异减速
- C.晚期减速
- D.基线变异6次/分
- E.胎心率波动范围在10~25次/分

[单选题][2分][难度 2]

104、患者,女,24岁,孕41周,G2P0,产程进展顺利,宫口开全,胎头拨露,LOA。电子胎心监护提示“晚期减速”,此时最适宜的处理措施是(E)

- A.剖宫产术
- B.臀牵引术
- C.待其自然分娩
- D.催产素静滴
- E.立即产钳助产结束分娩

[单选题][2分][难度 2]

105、一孕妇临产8小时,宫口开全,因羊水Ⅱ度污染,借助胎头吸引器娩出新生儿,生后1分钟Apgar评分3分,此时首要措施应是(C)

- A.口对口人工呼吸
- B.面罩吸氧
- C.吸出羊水和黏液、保暖
- D.脐静脉注射5%碳酸氢钠液
- E.刺激啼哭

[单选题][2分][难度 2]

106、李某,女,第一胎,过期妊娠,羊膜已破,羊水呈淡绿色色稍粘稠。检查:宫口开全,S+2,ROA。胎心170次/分;行产钳助产,生后四肢稍屈,心率70次/分,刺激无反应,皮肤苍白,喘息样微弱呼吸。诊断为重度窒息。新生儿窒息ABCDE复苏程序中,“A”指的是(B)

- A.药物治疗
- B.清理呼吸道
- C.评价

- D.维持正常循环
- E.建立呼吸

[单选题][2分][难度 2]

107、朱某,第一胎,足月临产,羊膜已破,羊水呈淡绿色,稍粘稠。检查:宫口开全,S+2,LOA。胎心168次/分;行产钳助产,生后四肢稍屈,心率80次/分,刺激无反应,皮肤苍白,喘息样微弱呼吸。该新生儿诊断(C)

- A.胎儿宫内窘迫
- B.新生儿轻度窒息
- C.新生儿重度窒息
- D.特发性呼吸窘迫综合征
- E.正常新生儿

[单选题][2分][难度 2]

108、某产妇,双胎妊娠,产前合并有轻度妊娠期高血压疾病,产后阴道持续出血,胎儿娩出后24小时出血量达600ml,检查子宫软,按摩后子宫变硬,阴道流血减少,该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是(A)

- A.子宫收缩乏力
- B.胎盘残留
- C.软产道裂伤
- D.凝血功能障碍
- E.胎膜残留

[单选题][2分][难度 2]

109、某产妇,自然分娩一女婴,产后阴道持续出血,胎儿娩出后24小时出血量达800ml,检查子宫软,按摩后子宫变硬,阴道流血减少,该产妇诊断为产后出血。该产妇最不可能出现的护理问题是(E)

- A.有组织灌注量改变的危险
- B.有感染的危险
- C.疲乏
- D.有受伤的危险
- E.潜在并发症:心力衰竭

[单选题][2分][难度 2]

110、母乳指导中不妥的是(C)

- A.宣传母乳喂养好处
- B.告诉产妇开奶越早越好
- C.待下奶后立即哺乳
- D.吸吮乳头可使生乳素增加
- E.吸吮有助于乳汁分泌

[单选题][2分][难度 2]

111、妊娠合并糖尿病产妇的新生儿，娩出 30 分钟内应 (E)

- A.早吸吮
- B.母乳喂养
- C.喂白开水
- D.不需喂哺
- E.滴服 10%的葡萄糖液

[单选题][2分][难度 2]

112、某孕妇，29 岁。妊娠 30 周，测空腹血糖，2 次均 > 5.8mmol/L，诊断为妊娠期糖尿病。不恰当的护理措施是 (C)

- A.监测血糖变化织四圆的贝常量血出台流
- B.指导孕妇饮食
- C.指导正确的口服降糖药方法
- D.告知胰岛素治疗的注意事项
- E.指导患者适度运动

[单选题][2分][难度 2]

113、急产是指总产程在 (B)

- A.7 小时内
- B.3 小时内
- C.4 小时内
- D.5 小时内
- E.6 小时内

[单选题][2分][难度 2]

114、某产妇，G2P0，孕 35 周，前次分娩因急产胎儿坠地后死亡。下列处理要点不正确的是 (C)

- A.必要时提前住院待产
- B.卧床休息时最好左侧卧位
- C.临产后静滴缩宫素，加强宫缩的吉是光
- D.新生儿按医嘱给止血剂
- E.产后应观察出血量

[单选题][2分][难度 2]

115、某产妇 26 岁，在产程中，宫口开大 2cm，出现协调性子宫收缩乏力，最恰当的处理措施是 (B)

- A.镇静剂
- B.催产素静滴
- C.人工破膜
- D.顺其自然，直至分娩

E.剖宫产

[单选题][2分][难度 2]

116、产妇，28 岁。自然分娩一女婴，产后 3 小时出血约 800ml。为处理产后出血，使用宫腔填塞纱布条的情形是

- A. 软产道裂伤 (C)
- B.胎盘因素导致的产后出血
- C.凝血功能障碍
- D.子宫全部松弛无力，缺乏输血条件，病情危急时
- E.按摩子宫无效时

[单选题][2分][难度 2]

117、某产妇，自然分娩一女婴，产后阴道持续出血，胎儿娩出后 24 小时出血量达 800ml，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。该产妇最不可能出现的护理问题是 (D)

- A.有组织灌注量改变的危险
- B.有感染的危险
- C.疲乏
- D.有受伤的危险
- E.焦虑

答案：D

[单选题][2分][难度 2]

118、不属于先兆子宫破裂的临床表现为 (E)

- A.子宫收缩力强
- B.子宫病理性缩复环
- C.子宫下段压痛
- D.胎心音 100 次/min
- E.腹壁下清楚触及胎儿肢体

[单选题][2分][难度 2]

119、出现子宫破裂时应立即用 (A)

- A.哌替啶
- B.钙剂
- C.硫酸镁
- D.地塞米松
- E.缩宫素

[单选题][2分][难度 2]

120、患者，女性。足月产后 3 天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软。考虑其最可能的病理是 (A)

- A. 子宫内膜炎
- B. 子宫肌炎
- C. 盆腔结缔组织炎
- D. 急性输卵管炎
- E. 腹膜炎